参考文献

1．公益社団法人日本化学療法学会理事長　髙橋聡、一般社団法人日本感染症学会理事長　松本哲哉、一般社団法人日本臨床微生物学会理事長　松本哲哉、一般社団法人日本環境感染学会理事長　四柳　宏、日本細菌学会理事長　飯田哲也、公益社団法人日本薬学会会頭　石井伊都子、公益社団法人日本獣医学会理事長　内田和幸、７学会合同感染症治療・創薬促進検討委員会　提言　感染症治療薬創薬促進に向けて（2026年７月予定）

2．田前雅也、危機に強い医薬品安全保障の確立―医薬品国内自給率３割を克服するために、社会保険旬報 2026年３月21日号・４月１日号

3．感染症危機対応医薬品等（ワクチン、治療薬、診断薬等）開発・生産体制強化戦略＜令和８年３月24日閣議決定＞、https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/kenkouiryou/senryaku/r080324vaccine_senryaku.pdf

4．厚生労働省、第39回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会　研究開発及び生産・流通部会（資料4-1）、2026（令和８）年３月30日、感染症危機対応医薬品等（ワクチン、治療薬、診断薬等）開発・生産体制強化戦略について（報告）、https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001681710.pdf

5．Bassetti M, et al. Efficacy and safety of cefiderocol or best available therapy for the treatment of serious infectious caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria (CREDIBLE-CR): a randomised, open-label, multicentre, pathogen-focused, descriptive, phase 3 trial. Lancet Infect Dis 2021; 21: 226-240

6．Wunderink RG, et al. Cefiderocol versus high-dose, extended-infusion meropenem for the treatment of Gram-negative nosocomial pneumonia (APEKS-NP): a randomised, double-blind, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis 2021; 21: 213-225

7．Portsmouth S, et al. Cefiderocol versus imipenem-cilastatin for the treatment of complicated urinary tract infections caused by Gram-negative uropathogens: a phase 2, randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis 2018; 18: 1319-1328

8．Takahashi S, et al. Efficacy and safety of cefepime-nacubactam and aztreonam-nacubactam compared with imipenem-cilastatin for complicated urinary tract infection or acute uncomplicated pyelonephritis (Integral-1): a double-blind, randomised phase 3 trial. The Lancet. 2026; 407: 1929-1940

電子メールによる会員への情報提供について
－メールアドレスの登録－

◇情報広報部◇

本会では、インターネットを利用し、電子メールにより緊急性の高い情報を、会員の皆様に送信提供しております。対象は当会の電子メールアドレス利用者全員と他プロバイダの電子メールアドレスをお持ちになっていて、本会にアドレスを登録している会員です。

他プロバイダの電子メールアドレスの登録につきましては、随時受け付けておりますので、是非ご登録いただきたくご案内いたします。

●電子メールアドレスの登録方法

電子メールで、ご氏名、登録メールアドレスを明記のうえ、下記宛お送りください。

・申込先メールアドレス：**add@m.doui.jp**